ANNALES

DE

L'INSTITUT OCÉANOGRAPHIQUE

NOUVELLE SÉRIE

Tome 57

MASSON

Paris New York Barcelone Milan

1981

INDEX

UMI

ANNALES DE L'INSTITUT OCÉANOGRAPHIQUE

(NOUVELLE SÉRIE)

TOME 57 — 1981

TABLE

Fascicule 1

BAGNIS (R.). — L'ichtyosarcotoxisme de type Ciguatera : processus biologiques connus et perspectives au seuil des années 80 5-24

SARDOU (J.). — Contribution à la connaissance de la faune ichthyologique liguro-provençale : *Melanostigma atlanticum* Koefoed, 1952 (Zoarcidae), poisson nouveau pour la faune française..... 25-30

NIVAL (S.) et RAVERA (S.). — Evaluation des potentialités alimentaires chez deux Cladocères planctoniques, *Podon intermedius* Lilljeborg et *Podon (Pleopsis) polyphemoïdes* Leuckart *(Crustacea, Branchiopoda)*, par une étude de morphologie fonctionnelle des structures cuticulaires au microscope électronique à balayage..... 31-40

MONTAGGIONI (L. F.). — Les associations de Foraminifères dans les sédiments récifaux de l'archipel des Mascareignes (Océan Indien) 41-62

Fascicule 2

MEINESZ (A.), ASTIER (J.-M.) et LEFÈVRE (J.-R.). — Impact de l'aménagement du domaine maritime sur l'étage infralittoral du Var, France (Méditerranée occidentale) 65-77

VÉNEC-PEYRÉ (M.-TH.) et SALVAT (B.). — Les Foraminifères de l'atoll de Scilly (Archipel de la Société) : étude comparée de la biocénose et de la thanatocénose 79-110

BACHELET (G.) et CORNET (M.). — Données sur le cycle biologique d'*Abra alba* (Mollusque bivalve) dans la zone Sud-Gascogne..... 111-123

YASSEN (SUFIAN TAHA). — Méthode d'élevage de Copépodes Planctoniques au laboratoire *(Temora stylifera, Acartia clausi)*. Estimation du taux de mortalité 125-132

ANNALES DE L'INSTITUT OCÉANOGRAPHIQUE

(NOUVELLE SÉRIE)

TOME 57 — 1981

INDEX

Issue 1

BAGNIS (R.). — Ichtyosarcotoxism of the ciguatera type : identified biological processes and prospects in the 1980's 5-24

SARDOU (J.). — Contribution to the knowledge of the liguro-provençal ichthyological fauna : *Melanostigma atlanticum* Koefoed, 1952 (Zoarcidae), a new fish in the French fauna 25-30

NIVAL (S.) and RAVERA (S.). — An assessment of the feeding potentialities of two planktonic Cladocerans, *Podon intermedius* Lilljeborg and *Podon (Pleopsis) polyphemoïdes* Leuckart *(Crustacea, Branchiopoda)*, by means of a scanning electron microscope study of the functional morphology of cuticular structures 31-40

MONTAGGIONI (L. F.). — Foraminiferal assemblages in reef sediments from the Mascarene archipelago (Indian ocean) 41-62

Issue 2

MEINESZ (A.), ASTIER (J.-M.) and LEFÈVRE (J.-R.). — Impact of coastal development on the infralittoral zone of Var - France (Occidental Mediterranean coasts) 65-77

VÉNEC-PEYRÉ (M.-TH.) and SALVAT (B.). — Foraminifera of the Scilly atoll lagoon (Society Islands) : Comparative studies of biocoenosis and thanatocoenosis 79-110

BACHELET (G.) and CORNET (M.). — Some data on the life history of *Abra alba* (Mollusca, Bivalvia) in the South area of the Bay of Biscay..... 111-123

YASSEN (SUFIAN TAHA). — Laboratory method for breeding planktonic copepods *(Temora stylifera* and *Acartia clausi)*. Estimation of mortality rate 125-132